



Protocole de recueil d'urines pour ECBU

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

OBLIGATOIRE !!

- Signes cliniques :**
- brûlures en urinant ?
 - fréquente envie d'uriner ?
 - fièvre? frissons ?
 - douleurs lombaires ?
 - bilan de routine (absence de signe clinique urinaire)
 - autre:

Traitement antibiotique débuté avant l'examen : oui non

Nom de l'antibiotique

Sonde urinaire : oui non

Grossesse : oui non

Avant intervention chirurgicale urologique : oui non

Après intervention chirurgicale des voies urinaires : oui non

Contrôle après traitement : oui non

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT:

De préférence au moins 4h après la dernière miction (ou urine du matin)

- Se laver les mains.
- Faire une toilette locale à l'aide de lingettes désinfectantes remises par le laboratoire ou de savon antiseptique.
- Éliminer le premier jet dans les toilettes.



En cas de recherche de **Chlamydiae** et/ou de **Mycoplasmes**, le **premier jet** doit être recueilli, avant tout nettoyage, au moins 2h après la dernière miction, dans un flacon distinct de celui destiné à l'ECBU.

- Uriner ensuite dans le flacon stérile fourni par le laboratoire et le refermer soigneusement.
- Identifier le flacon avec vos nom, prénom, date et heure du recueil.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (maximum 2 heures à température ambiante).

Il peut éventuellement être conservé 12 heures au réfrigérateur (+4°C) si un acheminement rapide est impossible.