

Protocole de recueil d'urines pour ECBU

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

- Signes cliniques : brûlures en urinant ?
 fréquente envie d'uriner ?
 fièvre? frissons ?
 douleurs lombaires ?
 bilan de routine (absence de signe clinique urinaire)
 autre:

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Heure recueil :

Traitement antibiotique débuté AVANT l'examen : oui non

Traitement antibiotique débuté APRES l'examen : oui non

Nom de l'antibiotique

Sonde urinaire : oui non

Grossesse : oui non

Avant intervention chirurgicale urologique : oui non

Après intervention chirurgicale des voies urinaires : oui non

Contrôle après traitement : oui non

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT:

De préférence au moins 4h après la dernière miction (ou urine du matin)

- Se laver les mains.
- Faire une toilette locale à l'aide de lingettes désinfectantes (si recueil au laboratoire) ou de savon antiseptique (si recueil à domicile).
- Éliminer le premier jet dans les toilettes.



En cas de recherche de **Chlamydiae** et/ou de **Mycoplasmes**, le **premier jet** doit être recueilli, avant tout nettoyage, au moins 2h après la dernière miction, dans un flacon distinct de celui destiné à l'ECBU.

- Uriner ensuite dans le flacon stérile fourni par le laboratoire et le refermer soigneusement.
- Identifier le flacon avec vos nom, prénom, date et heure du recueil.

**Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais
 Il doit être conservé maximum 12h au réfrigérateur (+4°C) si un
 acheminement en moins de 2h est impossible.**